

Àliga calçada (*Aquila pennata*)



És l'àliga més petita que apareix a la Península Ibèrica. Com el seu hàbitat, utilitza zones reforestades principalment de *P. nigra* i

sylvestris amb arbres grans encara que pot utilitzar boscos mixtos de *pinus sp.* i *Quercus sp.* per a instal·lar els nius i zones clares i les vores dels boscos per a la obtenció d'aliment.

Aligot comú (*Buteo buteo*)



Rapinyaire de mitjana grandària, amb les ales relativament llargues i amples. Cua ampla i curta de forma arrodonida. Cap

robust i amb un coll curt. Predominen a les zones boscoses davant les de matoll, que normalment són utilitzades juntament amb les zones de cultiu per caçar, com la Conca de Barberà. En general assoleix el seu òptim en zones mosaic de bosc i prats amb cultius on abunden els micromamífers.

Astor (*Accipiter gentilis*)



Espècie d'interès especial. Posseeixen ales amples, curtes i arrodonides, la longitud de les quals arriba a la meitat de la cua essent

aquesta llarga i punxeguda. Migrador i hivernant en nombroses zones de l'interior de Catalunya. Habiten zones boscoses sobretot pinedes, utilitzant boscos illa rodejats de zones cultivades per a aixoplugar-se i caçar.

Àliga marcenca (*Circaetus gallicus*)



Rapinyaire de grandària considerable amb el cap molt ample i prominent recordant a les de les aus nocturnes. Les ales són llargues i amples. La cua és relativament llarga i

recta. S'alimenta a base de rèptils. Construeix els nius en pins de gran alçada sobre tot a les copes dels arbres o en branques laterals on no tingui dificultat per a posar-se.